

Ocorrência da sífilis congênita no Brasil

**Audiência Pública
Comissão de Defesa dos Direitos
da Mulher
Comissão de Seguridade Social e
de Família**

Brasília, 24/05/2017



**SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PEDIATRIA**



Resultados de estudos disponíveis

- A maioria das mulheres com diagnóstico de sífilis na gestação não recebem abordagem terapêutica adequada
- Pouco mais da metade dos casos de sífilis em gestantes foram detectados na gestação
- Taxa de adesão dos parceiros no tratamento é pequena
- Insuficiência de profissionais capacitados para aplicação da penicilina Unidades de Saúde
- Não aplicação de protocolos clínicos em grande parte das Unidades de Saúde
- Má qualidade da informação

CFM, FEBRASGO, SBP: plano de prevenção da transmissão vertical da sífilis

1. Ampliação do acesso ao pré-natal, com acompanhamento de médicos para o diagnóstico e a prescrição de tratamento
2. Formação de equipes multidisciplinares para assegurar cuidado integral à gestante e dar seguimento ao plano terapêutico para cada situação
3. Oferta de quantidades suficientes de penicilina benzatina para tratar gestantes e seus parceiros e de penicilina cristalina para crianças com sífilis congênita
4. Garantia às gestantes ao acesso aos exames de detecção da doença (VDRL) em todo o pré-natal, com assistência integral às mulheres soropositivas
5. Conscientização dos homens a buscar tratamento, quando houver diagnóstico da doença, reduzindo-se chances de (re)contaminação de suas parceiras
6. Elaboração de estudos e qualificação do sistema de vigilância sanitária para identificar fatores do aumento da incidência para prevenção

Documento "Alerta da situação da sífilis no Brasil", outubro, 2016

SBP para a redução da sífilis congênita no Brasil

- Câmara Técnica de Pediatria-CFM, FEBRASGO, SBP: “alerta da situação de sífilis congênita no Brasil” (10/2016)
- II Fórum de Pediatria do CFM
- Câmara Técnica de Ginecologia, Obstetrícia-CFM
- Carta-compromisso: Agenda de Ações Estratégicas para redução da Sífilis Congênita no Brasil (10/2016)
- Grupo Técnico de Epidemiologia (02/2017)
- Departamentos Científicos: publicações, congressos, simpósios, reuniões, aulas, site SBP

Agenda de ações estratégicas para redução da sífilis congênita no Brasil

Diretrizes da OMS e OPAS para prevenção, diagnóstico, tratamento e vigilância

- Comitês
- Certificação
- Comunicação
- Educação
- Qualificação das informações
- Divulgação, protocolos, notas informativas, boletim epidemiológico, cursos, artigos científicos, portarias, pareceres e vídeos

MS, outubro/2016

Agenda de ações estratégicas para redução da sífilis congênita no Brasil

- Captação precoce da gestante no pré-natal
- Fortalecer o pré-natal do parceiro
- Ampliar diagnóstico: testes rápidos, tratamento na atenção básica e maternidades
- Incentivar a aplicação da penicilina pela enfermagem
- Educação permanente- gestores, profissionais e comunidade
- Comunicação em saúde – dar visibilidade ao tema gestores, profissionais, comunidade principalmente gestantes e parceiros


MS, OUTUBRO, 2016

Agenda de ações estratégicas para redução da sífilis congênita no Brasil

- Qualificar informações epidemiológicas, notificação e investigação com seguimento clínico laboratorial e fechamento dos casos de sífilis
- Fortalecer alianças
- Ampliar a criação de comitês de investigação de HIV e sífilis – transmissão vertical
- Implementar o processo de validação para certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e sífilis nos municípios do país.

MS, OUTUBRO, 2016

CUIDADO PERINATAL: INTEGRAÇÃO E CONTINUIDADE DO PERCURSO CLÍNICO






REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE




Fonte: SES/MG

REDE PERINATAL



- REGULAÇÃO
- TRANSPORTE
- SISTEMA DE INFORMAÇÃO PERINATAL
- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- APOIO DIAGNÓSTICO

PERCURSO CLÍNICO PERINATAL: COMPONENTE HOSPITALAR



Complicações perinatais da Sífilis Congênita

- Aborto, morte fetal, morte neonatal
- Baixo peso ao nascer
- Prematuridade
- Sepsis: instabilidade clínica
- Quadro subclínico com manifestações no final do período neonatal

Sífilis congênita

SÍFILIS CONGÊNITA
PRECOCE-
MANIFESTAÇÕES NOS
PRIMEIROS DOIS ANOS DE
VIDA

SÍFILIS CONGÊNITA TARDIA



Diagnóstico: avaliação epidemiológica, laboratorial e clínica

Manual técnico para o diagnóstico da sífilis, 2016
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis, 2015

Diagnóstico



Para definição do diagnóstico da sífilis congênita, são realizados os exames complementares:


Amostra de sangue: sorologia, hemograma, perfil hepático e eletrólitos

Avaliação neurológica, incluindo punção liquórica: células, proteínas, testes treponemos e não treponemos

Raio-X de ossos longos

Avaliação oftalmológica e audiológica

MUITO OBRIGADA!



ALBERTIN@MEDICINA.UFMG.BR

