

SIC - Síndrome do Intestino Curto



Júlia Assis - ALEMDII



sobrevivente

da doença de Crohn

O desejo de ter qualidade de vida com uma DII trouxe meu olhar para as dificuldades dos pacientes do interior.

Empatia, compaixão e empoderamento me levaram a fundar a ALEMDII e hoje o trabalho vai muito além de Caratinga/MG, passando por todo Brasil e outros países.

sobrevivente

da doença de Crohn

- Sou Cirurgiã Dentista com pós graduação em Saúde da Família e atuo no SUS desde 2001;
- Atualmente sou Presidente e Membro do Comitê Científico da ALEMDII,
- Membro do Conselho Editorial da Revista ABCD em Foco,
- Representante da ALEMDII na Biored Brasil e Alianza Latina, rede a qual a ALEMDII se destacou entre as Top 10 por dois anos.
- Estou como membro titular da CIABS /CNS pela Biored Brasil;
- **Não tenho conflitos de interesse para essa participação.**



Síndrome do Intestino Curto - SIC

- Condição clínica complexa, rara¹
- Resulta da perda da capacidade absorptiva intestinal devido à ressecção cirúrgica, trauma, infarto, defeito congênito ou doença¹
- Caracterizada pela incapacidade de manter o equilíbrio de proteína-energia, fluido, eletrólito ou micronutriente com dieta convencional¹
- Condição heterogênea necessitando de controle individualizado²
- Os pacientes com SIC são propensos à diarreia/esteatorreia, dor abdominal, desnutrição, perda de peso e desidratação²
- Frequentemente necessitam de nutrição parenteral (PN)/suporte intravenoso (IV) de longo prazo
- Complicações severas podem trazer riscos à vida do paciente

• O'Keefe SJ, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006;4:6-10;

• Nightingale JM, ed. Intestinal Failure. London: Greenwich Medical Media; 2001:177-198

SIC - Definição de SIC da ESPEN

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism

Tipo de FI	Descrição
Tipo I	Aguda, de curto prazo; comumente autolimitante
Tipo II	Condição aguda prolongada; necessita de cuidados multidisciplinares complexos e IVS durante períodos de semanas ou meses
Tipo III	Condição crônica; necessita de IVS durante meses ou anos; pode ou não ser reversível

**Ainda não temos dados sobre a SIC no Brasil;
É ultrarara; (incidência <1 para cada 50.000
habitantes);**



SIC -

Prevalência exata da SIC é desconhecida e pode variar


Epidemiologia

Estimativas de prevalência da SIC foram baseadas no uso de NPT* 25,

Referência	Região	Desenho	Estimativa de Prevalência de NPT-D em Adultos
Howard 1991 ²	Estados Unidos	<u>Registro OASIS</u> Dados coletados de 1984-1987 sobre pacientes em NPT-D em 7 categorias de doença afetando o intestino.	19.700 pacientes receberam NPT-D em 1987 e crescimento de terapia teve uma média de aproximadamente 8% por ano.
Van Gossum 1999 ³	Europa	<u>Dados de pesquisa de 1998</u> 494 pacientes com várias doenças exigindo NPT-D (35% com SIC).	Dinamarca: 12,7 por milhão de habitantes Reino Unido: 3,7 por milhão de habitantes Países Baixos: 3,7 por milhão de habitantes França: 3,6 por milhão de habitantes Bélgica: 3,0 por milhão de habitantes Polônia: 1,1 por milhão de habitantes
Juana-Roa 2011 ⁴	Espanha	<u>Dados de pesquisa de 2008</u> 201 pacientes em NPT-D (% com SIC desconhecida)	5,1/milhão de habitantes
von Websky 2014 ⁵	Alemanha	<u>Dados de pesquisa de 2011/2012</u> 2.808 pacientes com SIC.	34/milhão de habitantes
Brandt 2016 ⁶	Dinamarca	Estudo de coorte de pacientes com IF em alta com NPT-D de 1970–2010	80/milhão de habitantes

- Kelly D, et al. J Parent Enteral Nutr. 2014;38:427-437
- Howard L, et al. J Parenter Enteral Nutr. 1991;15:384-393
- Van Gossum A, et al. Clin Nutr. 1999;18:135-140

- 4. Juana-Roa J, et al. Nutr Hosp. 2011;26:364-368
- 5. von Websky MW, et al. Chirurg. 2014;85:433-439
- 6. Brandt CF, et al. JPEN 2017;41(7):1178-87



ELSEVIER

Gastroenterología y Hepatología

Current management of bowel failure due to Crohn's disease in Spain: Results of the GETECCU survey



Cristina Suárez Ferrer, María Dolores Martín-Arranz, Eduardo Martín-Arranz, Francisco Rodríguez Morata, Alicia López García, Jose Manuel Benítez Cantero, Francisco Mesonero Gismero, Manuel Barreiro-de Acosta

10.1016/j.gastre.2022.10.005

Gastroenterol Hepatol. 2023;46:439-45



GRUPO ESPAÑOL DE TRABAJO
EN ENFERMEDAD DE CROHN Y
COLITIS ULCEROSA

A falência intestinal é uma patologia rara, e a doença de Crohn (DC) é uma das causas mais frequentes em adultos.

Questões sobre o diagnóstico, manejo e conhecimento atual da falência intestinal na DC.

49 médicos de diferentes serviços espanhóis (19 cidades)

24% desconheciam a doença, não sabiam se havia pacientes em seu serviço.

Conclusão: Foram registrados 228 pacientes com falência intestinal, 89 (40%) pacientes tinham DC.

Nas questões relacionadas ao conhecimento sobre falência intestinal, este foi considerado limitado (53,1%) ou muito limitado (12,2%) pelos pesquisados.

A chave para a
tirarmos a SIC do
desconhecimento é a
informação!




Precisamos de um dia nacional de conscientização da SIC

Que ela seja vista como doença (CID 11)

Divulgar a SIC

Conhecer e melhorar a jornada de vida real das pessoas que vivem com a SIC





Quem decide um caso sem ouvir a outra parte não pode ser considerado justo, ainda que decida com justiça.

Sêneca




MUITO OBRIGADA!

 **@juliaassis.oficial**

Júlia Assis
julia@alemdii.org.br
(+55) 33 99954-2076
www.alemdii.org.br

 **@Alemdii**

 **@farmaleachou**